

## Surfaces écologiques - Prairies extensives

Fleurs	Fleurs lat.	Salvia g/a	Humida g/a	Montagna g/a	Broma g/a
Bugle rampante	Ajuga reptans	0.05	0.15	0.10	0.10
Flouve odorante	Anthoxanthum odoratum	0.50	1.00	0.60	0.70
Anthyllide vulnérable	Anthyllis vulneraria ssp. carpatica	0.30		0.80	0.50
Brize intermédiaire	Briza media	0.50		0.60	0.80
Campanule agglomérée	Campanula glomerata			0.05	
Campanule étalée	Campanula patula	0.02	0.02		0.05
Campanule raiponce	Campanula rapunculoides			0.03	
Campanule à feuilles rondes	Campanula rotundifolia	0.03			0.05
Cardamine des prés	Cardamine pratensis	0.15			
Cumin des prés	Carum carvi	0.30	0.50	0.70	
Centauree scabieuse	Centaurea scabiosa	0.20			0.25
Centauree jacée	Centaurea jacea	0.15	0.50	0.30	0.20
Cirse maraîcher	Cirsium oleraceum	0.30			
Sarriette vulgaire	Clinopodium vulgare	0.10			0.05
Crépepe bisannuelle	Crepis biennis	0.05	0.05	0.05	
Carotte	Daucus carota	0.05			0.10
Gaïlet jaune	Galium verum		0.10		
Hélianthe nummulaire	Helianthemum nummularium			0.30	
Avoine pubescente	Helictotrichon pubescens	1.35	2.40	1.50	1.50
Épervière piloselle	Hieracium pilosella			0.05	
Hippocrépe à toupet	Hippocrepis comosa			0.20	
Knautie des champs	Knautia arvensis	0.55			0.40
Gesse des prés	Lathyrus pratensis	0.30	0.50	0.30	0.40
Liondent hispide	Leontodeon hispidum	0.15	0.30	0.20	0.15
Marguerite	Leucanthemum vulgare	0.45	0.50	0.55	0.45
Lupuline	Medicago lupulina	1.50	1.40	1.70	0.60
Myosotis des marais	Myosotis scorpioides	0.10			
Escarotte	Onobrychis viciifolia	0.70		1.50	1.00
Picride fausse épervière	Picris hieracoides	0.10			0.15
Grand boucage	Pimpinella major	0.10	0.25	0.20	
Plantain lancéolé	Plantago lanceolata	0.05	0.20	0.15	0.10
Plantain moyen	Plantago media			0.10	
Potentille du printemps	Potentilla neumaniana			0.10	
Primevère du printemps	Primula veris	0.10			0.22
Brunelle à grandes fleurs	Prunella grandiflora			0.20	
Brunelle vulgaire	Prunella vulgaris	0.13	0.15		
Sauge des prés	Salvia pratensis	0.85		0.75	0.50
Petite pimprenelle	Sanguisorba minor	0.85			0.80
Pimprenelle officinale	Sanguisorba officinalis	0.20			
Scabieuse colombaire	Scabiosa columbaria	0.05			0.20
Silène dioïque	Silene dioica	0.25	0.20		
Silène fleur-de-coucou	Silene flos-cuculi	0.15			
Silène penché	Silene nutans		0.10		
Silène vulgaire	Silene vulgaris	0.05		0.05	0.10
Épiaire officinale	Stachys officinalis			0.20	
Thym faux pouliot	Thymus pulegioides			0.10	
Salutifs des prés	Tragopogon orientalis	0.80	1.00	1.00	0.45
Trèfle des montagnes	Trifolium montanum		0.00	0.20	
Trèfle des prés	Trifolium pratense	0.10	0.05	0.05	0.20
Vesce cracca	Vicia cracca	0.25	0.25		
Vesce des haies	Vicia sepium	0.20	0.40	0.30	
<b>Total g/a</b>		<b>10.5</b>	<b>10.5</b>	<b>12.0</b>	<b>12.0</b>

Composition des mélanges g/a	450 Salvia	450 Humida	451 Montagna	455 Broma
Mélange de base trèfles / graminées	199.50	199.50	228.00	138.00
Complément de fleurs	10.50	10.50	12.00	12.00
Marqueur de semis	190.00	190.00	160.00	160.00
Quantité de semences totale kg/ha	40.00	40.00	40.00	40.00
CHF/kg	32.00	33.90	33.10	39.80
Coût CHF/ha	1280.00	1356.00	1324.00	1592.00

Mélange	kg/ha	Remarques
Mélange standard 450 S	60	Sans complément de fleurs, avec marqueur de semis, avec trèfle blanc, nouveau semis non valable pour surfaces écologiques
Mélange standard 450 Salvia	40	Pour endroits normaux à secs, avec marqueur de semis, sans trèfle blanc, jusqu'à 900 m env. (prairie fromental)
Mélange standard 450 Humida	40	Pour endroits humides jusqu'à 900 m env., sans trèfle blanc (prairie fromental)
Mélange standard 451	40	Sans complément de fleurs, nouveau semis non valable pour surfaces écologiques!
Mélange standard 451 Montagna	40	Avec des fleurs, jusqu'à 1200 m env. (prairie d'avoine jaunâtre)

**Lit de semis** Semis dans un sol labouré avec peu d'adventices et bien tassé, à la volée ou en lignes, à 1 cm de profondeur au maximum.

**Époque de semis** (mars)-Juin et mi-août à mi-septembre. La germination des fleurs est très lente. L'année du semis on trouve peu de fleurs. Une prairie extensive durable se développe en plusieurs années.

**Entretien** Les surfaces doivent être fauchées au moins une fois par an. La première fauche ne peut pas avoir lieu avant le 15 juin en région de plaine, le 1er juillet dans les zones de montagne I et II. Phytosanitaires: plante par plante seulement. Pas de mulching. La pâture d'automne ne peut pas commencer avant le 1er septembre